

COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES – B – (X)

(Durée : 4 heures)

L'utilisation des calculatrices n'est pas autorisée pour cette épreuve.

★ ★ ★

Toute affirmation doit être clairement et complètement justifiée.

On considère une variable aléatoire X discrète définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ dont la loi est donnée par :

$$\forall i \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}(X = x_i) = p_i \geq 0 \quad \text{avec} \quad \sum_{i=0}^{+\infty} p_i = 1,$$

et où $(x_i)_{i \geq 0}$ est une suite de réels strictement positifs distincts. On suppose que X admet une espérance finie notée $m := \mathbb{E}(X) > 0$.

Soit $(X_k)_{k \geq 1}$ une suite de variables aléatoires définies sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, indépendantes et identiquement distribuées, de même loi que X . On note $(S_k)_{k \geq 0}$ ses sommes partielles définies par

$$S_0 = 0, \quad \text{et pour } n \geq 1, \quad S_n = \sum_{k=1}^n X_k.$$

L'objet de ce problème est l'étude du nombre (aléatoire) d'éléments de la suite $(S_n)_{n \geq 0}$ qui appartiennent à l'intervalle $[a, b]$, défini pour $\omega \in \Omega$ par

$$N(a, b)(\omega) = \text{Card}\{k \in \mathbb{N} \mid S_k(\omega) \in [a, b]\} = \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{1}_{(S_k \in [a, b])}(\omega),$$

et en particulier le comportement de $N(a, b)$ quand a et b tendent vers l'infini.

Première partie

1a. Justifier que pour tous $\ell \geq 0$ et $n \in \mathbb{N}$, $(N(0, \ell) = n + 1) = (S_n \leq \ell < S_{n+1})$ à un ensemble négligeable près. En déduire que, à des ensembles négligeables près,

$$(S_n \leq \ell) = (N(0, \ell) \geq n + 1) \quad \text{et} \quad (S_n \geq \ell) \subset (N(0, \ell) \leq n + 1).$$

1b. On suppose dans cette question que X admet de plus une variance finie V . Montrer alors que

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \forall n \geq 1, \quad \mathbb{P}(S_n \leq n(m - \varepsilon)) \leq \frac{V}{\varepsilon^2 n}.$$

2. Soit Y une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ presque sûrement, et qui admet une espérance. Montrer que

$$\mathbb{E}(Y) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(Y \geq k).$$

3a. Montrer que pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $\ell \geq 0$,

$$\mathbb{P}(S_n \leq \ell) \leq \mathbb{E}(\exp(\ell - S_n)),$$

puis que

$$\mathbb{P}(S_n \leq \ell) \leq e^\ell \mathbb{E}(\exp(-X))^n.$$

3b. En déduire que $\mathbb{P}(S_n \leq \ell)$ tend vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$ et que

$$\mathbb{E}(N(0, \ell)) \leq \frac{e^\ell}{1 - \mathbb{E}(\exp(-X))}.$$

3c. Montrer que pour tous $x \in \mathbb{R}$, $\ell \geq 0$, $k \in \mathbb{N}^*$ et $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\mathbb{P}(S_{n-1} < x \leq S_n, N(x, x + \ell) \geq k) \leq \mathbb{P}(S_{n-1} < x \leq S_n) \mathbb{P}(N(0, \ell) \geq k),$$

puis que

$$\mathbb{E}(N(x, x + \ell)) \leq \frac{e^\ell}{1 - \mathbb{E}(\exp(-X))}.$$

Deuxième partie

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Si f est bornée, on note

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)|$$

sa norme uniforme. On appelle support de f l'adhérence de $\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \neq 0\}$. En particulier, si x n'appartient pas au support de f , alors $f(x) = 0$.

Soit $K > 0$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction positive bornée à support dans $[0, K]$. On va étudier la suite de fonctions $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définies pour $n \geq 0$ par

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^n \mathbb{E}(g(x - S_k)).$$

4a. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, la suite $(f_n(x))_{n \geq 0}$ est croissante. On note $f(x)$ sa limite dans $\mathbb{R} \cup \{+\infty\}$.

4b. Montrer que si $g = \mathbb{1}_{[0, K]}$, alors $f(x) = \mathbb{E}(N(x - K, x))$.

4c. En déduire que pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$,

$$0 \leq f_n(x) \leq \|g\|_\infty \frac{e^K}{1 - \mathbb{E}(\exp(-X))}.$$

4d. Conclure que la suite de fonctions f_n converge simplement vers une fonction f positive, bornée et dont le support est inclus dans $\mathbb{R}^+$.

5. Soit Y une variable aléatoire discrète, indépendante de X , et $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée. Montrer que

$$\mathbb{E}(\varphi(X, Y)) = \sum_{i=0}^{+\infty} p_i \mathbb{E}(\varphi(x_i, Y)).$$

6a. Montrer que pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$,

$$f_{n+1}(x) = g(x) + \sum_{i=0}^{+\infty} p_i f_n(x - x_i).$$

6b. Montrer que la fonction f vérifie l'égalité suivante sur $\mathbb{R}$

$$f(x) = g(x) + \sum_{i=0}^{+\infty} p_i f(x - x_i). \quad (E)$$

7. Soit $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée qui vérifie $h(x) = \sum_{i=0}^{+\infty} p_i h(x - x_i)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

7a. Montrer que pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, on a $h(x) = \mathbb{E}(h(x - S_n))$.

7b. En déduire que si de plus le support de h est inclus dans $\mathbb{R}^+$, alors pour tout $x \in \mathbb{R}$, $h(x) = 0$.

7c. Conclure qu'il existe une unique fonction bornée à support dans $\mathbb{R}^+$ solution de (E).

8a. Montrer que l'ensemble $\Lambda_X := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{y \in \mathbb{R} \mid \mathbb{P}(S_n = y) > 0\}$ est dénombrable et inclus dans $\mathbb{R}^+$.

On se donne une énumération de cet ensemble : $\Lambda_X = \{y_i \mid i \in \mathbb{N}\}$.

8b. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^n \sum_{i=0}^{+\infty} \mathbb{P}(S_k = y_i) g(x - y_i).$$

8c. En déduire qu'il existe une suite de réels positifs $(q_i)_{i \geq 0}$ telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \sum_{i=0}^{+\infty} q_i g(x - y_i), \quad \text{et} \quad \sum_{i \in \mathbb{N}, y_i \in [x-K, x]} q_i = \mathbb{E}(N(x - K, x)).$$

9a. Dans la formule précédente, montrer que la convergence de la série est normale sur tout segment de $\mathbb{R}$. On pourra utiliser la question 3c.

9b. On suppose que g est continue. Montrer que f est uniformément continue.

9c. On suppose que g est de classe $\mathcal{C}^1$. Montrer que g' bornée. En déduire que f est de classe $\mathcal{C}^1$, que f' est bornée et uniformément continue et que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = g'(x) + \sum_{i=0}^{+\infty} p_i f'(x - x_i).$$

Troisième partie

Soit Λ un sous-ensemble non vide de $\mathbb{R}_*^+$ tel que

$$\forall (x, y) \in \Lambda^2, \quad x + y \in \Lambda.$$

On dit que Λ est *stable par addition*.

10a. Montrer si $(x, y) \in \Lambda^2$, $(k, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$ et $k \leq n$, alors $nx + k(y - x) \in \Lambda$.

On définit

$$\Gamma = \{z \in \mathbb{R}_+^* \mid \exists (x, y) \in \Lambda, z = y - x\}, \quad \text{et} \quad r(\Lambda) = \inf \Gamma.$$

10b. Donner deux exemples de tels ensembles Λ , l'un pour lequel $r(\Lambda) > 0$ et l'autre pour lequel $r(\Lambda) = 0$.

11. Dans cette question, on suppose que $r(\Lambda) > 0$.

11a. Montrer qu'il existe $(a, b) \in \Lambda^2$ tels que $b - a \in [r(\Lambda), 2r(\Lambda)[$.

On note $d = b - a$.

11b. Soient $k, n \in \mathbb{N}$ tels que $k \leq n - 1$. Montrer que

$$\Lambda \cap [na + kd, na + (k + 1)d] = \{na + kd, na + (k + 1)d\}.$$

11c. Montrer qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $n_0a + n_0d > (n_0 + 1)a$ puis qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $a = kd$.

11d. En déduire que $\Lambda \subset d\mathbb{Z}$, où $d\mathbb{Z} = \{kd \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

12. On suppose maintenant que $r(\Lambda) = 0$.

12a. Soit $\eta > 0$. Montrer qu'il existe $A \geq 0$ tel que pour tout $x > A$,

$$\Lambda \cap [x, x + \eta] \neq \emptyset.$$

12b. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction uniformément continue. On suppose que pour toute suite $(x_n)_{n \geq 0}$ à valeurs dans Λ telle que $x_n \rightarrow +\infty$, $f(x_n) \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$. Montrer que $f(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$.

Quatrième partie

On suppose dans cette partie que pour tout $d \geq 0$,

$$\mathbb{P}(X \in d\mathbb{Z}) < 1.$$

13. On considère une fonction h uniformément continue et bornée sur $\mathbb{R}$ telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $h(x) \leq h(0)$ et

$$h(x) = \sum_{i=0}^{+\infty} p_i h(x - x_i).$$

On rappelle que pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, $h(x) = \mathbb{E}(h(x - S_n))$ (question **7a**).

13a. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $x \geq 0$ tels que $\mathbb{P}(S_n = x) > 0$, on a $h(-x) = h(0)$.

13b. Montrer que l'ensemble Λ_X défini à la question **8a** est stable par addition et que $r(\Lambda_X) = 0$.

13c. En déduire que $h(-x) \rightarrow h(0)$ quand $x \rightarrow +\infty$.

13d. Conclure que h est une fonction constante.

On suppose dans toute la suite que g est de classe $\mathcal{C}^1$, à support dans $[0, K]$ avec $K > 0$. On rappelle que f est la limite croissante des fonctions f_n et l'unique solution bornée et uniformément continue de l'équation (E).

14a. Prouver que la fonction $x \mapsto \sup_{t \geq x} f'(t)$ admet une limite finie quand $x \rightarrow +\infty$. On note

$$c := \lim_{x \rightarrow +\infty} \sup_{t \geq x} f'(t).$$

14b. Montrer qu'il existe une suite $y_n \rightarrow +\infty$ telle que $f'(y_n) \rightarrow c$ quand $n \rightarrow +\infty$.

On admet qu'il existe une sous-suite $(t_k)_{k \geq 0}$ de $(y_n)_{n \geq 0}$ telle que la suite de fonctions $(\xi_k)_{k \geq 0}$ définies par

$$\xi_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad t \mapsto \xi_k(t) = f'(t + t_k)$$

converge uniformément sur tout segment de $\mathbb{R}$ vers une fonction notée ξ .

14c. Montrer que ξ est constante, égale à c .

14d. Conclure que $c = 0$.

On montrerait de même que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \inf_{t \geq x} f'(t) = 0$, résultat que l'on admet dans toute la suite.

14e. En déduire que $f'(t) \rightarrow 0$ quand $t \rightarrow +\infty$.

14f. Montrer alors que pour tout $\ell \geq 0$, $f(t + \ell) - f(t) \rightarrow 0$ quand $t \rightarrow +\infty$.

On suppose dans toute la suite de cette partie que seul un nombre fini de p_i sont strictement positifs, et on pose

$$g_0(x) = \begin{cases} \mathbb{P}(X > x) & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

On admet que g_0 est continue par morceaux et à support dans un segment de $\mathbb{R}^+$, intégrable sur $\mathbb{R}$, et que $\int_0^{+\infty} g_0(t) dt = \mathbb{E}(X)$.

On note $\mathcal{F}$ l'ensemble des fonctions positives, bornées et à support dans un segment de $\mathbb{R}^+$. En utilisant la deuxième partie, pour tout $g \in \mathcal{F}$, on note Lg l'unique solution de (E) bornée à support dans $\mathbb{R}^+$.

Nous dirons que la suite $(t_k)_{k \geq 0}$ satisfait la propriété $(\mathcal{P})$ si $t_k \rightarrow +\infty$ et s'il existe une fonction continue bornée $\mu : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$, telle que pour toute fonction g de $\mathcal{F}$ continue par morceau,

$$Lg(t_k) \rightarrow \int_0^{+\infty} g(t) \mu(t) dt \quad \text{quand } k \rightarrow +\infty.$$

On admet que pour toute suite $(x_n)_{n \geq 0}$ tendant vers l'infini, il existe une sous suite $(t_k)_{k \geq 0}$ de $(x_n)_{n \geq 0}$ qui satisfait la propriété $(\mathcal{P})$.

15a. Montrer, en utilisant la question **14f**, que pour tous $g \in \mathcal{F} \cap \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}^+)$ et $\ell \geq 0$,

$$\int_0^{+\infty} g(t) (\mu(t + \ell) - \mu(t)) dt = 0.$$

15b. En déduire que μ est constante.

16a. Montrer que $Lg_0(x) = 1$ pour $x \geq 0$ et $Lg_0(x) = 0$ pour $x < 0$.

16b. En déduire que $\mu(t) = \frac{1}{\mathbb{E}(X)}$ pour tout $t \geq 0$.

17. Conclure que pour tout g de $\mathcal{F}$ continue par morceaux,

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{E}(g(x - S_k)) \rightarrow \frac{1}{\mathbb{E}(X)} \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) dt \quad \text{quand } x \rightarrow +\infty.$$

18. Soit $\ell > 0$ fixé. Déterminer le comportement de $\mathbb{E}(N(x, x + \ell))$ quand $x \rightarrow +\infty$. Interpréter le résultat. Ce résultat est-il vrai s'il existe $d > 0$ tel que $\mathbb{P}(X \in d\mathbb{Z}) = 1$?